

***Lactarius fulvissimus* et *subsericatus***

Marcel Lecomte



Photo M. Lecomte - ©

*Lactarius fulvissimus*

Selon mon expérience personnelle, et en suivant Marcel **BON !**

<i>fulvissimus</i> Romagnesi	<i>subsericatus</i> = <i>ichoratus</i> ss. Moser	<i>subsericatus</i> var. <i>pseudo-fulvissimus</i> Bon
<b>chapeau</b> roux fauve rougeâtre terne et pâle, avec plage centrale plus sombre, comme vaguement zonée ; nette ligne jaune sur la bordure du chapeau (vu du dessous)	lisse à velouté, roux fauve rougeâtre très marqué	roux orangé vif, à marge +/- décolorée
<b>pied</b> brun rougeâtre en bas	brun roux en bas	+/- uniforme
<b>lames</b> +/- décurrentes (insertion cannelée), peu serrées, crème jaune, interveinées	+/- décurrentes (insertion cannelée)	+/- décurrentes (insertion cannelée)
<b>lait</b> blanc, jaunissant sur le mouchoir après 10-15 minutes : on voit apparaître un cerne très net après 5 minutes) ; doux, à peine âcre	blanc, jaunissant très vite sur le mouchoir (moins de 2 minutes) ; doux, à peine âcre	blanc, jaunissant sur le mouchoir en 3-5 minutes ; doux, à peine âcre
<b>odeur</b> nette de <i>Lepiota cristata</i> ou <i>Scleroderma</i>	fruitée acidulée	fruitée caoutchouteuse
sous feuillus	sous <i>Picea abies</i> surtout	sous <i>Carpinus</i> en terrain argilo-calcaire

Il est nécessaire d'admettre que la couleur constitue un élément très variable, et nous allons rencontrer nombre de formes intermédiaires aux caractères généraux.



**M.T. BASSO** a revu ce groupe et a renommé *subsericatus*, selon les règles de priorité.

Nouveaux noms	
<i>fulvissimus</i> Romagnesi	pas de modification
<i>britannicus</i> Reid fo. <i>britannicus</i>	= <i>subsericatus</i> Kühner & Romagnesi = <i>ichoratus</i> ss. Moser
<i>britannicus</i> fo. <i>pseudofulvissimus</i> (Bon) Basso comb.nov.	= <i>subsericatus</i> var. <i>pseudofulvissimus</i> Bon



*Lactarius britannicus* fo. *britannicus* ↑ & *Lactarius britannicus* fo. *pseudofulvissimus* ↓

