

Lactarius violascens (J. Otto : Fr.)Fr.

Habitat

1 exemplaire trouvé le 27 septembre 2009 au bois du Val, commune de Baume-les-Dames ou Sechin (25110) Dans un bois mêlé de feuillus divers et d'épicéas sur sol calcaire.



Chapeau :

Diamètre 45 mm. Plan convexe. Revêtement un peu gras mais peu visqueux (temps particulièrement sec), brun jaune, zonné discrètement et cocardé au centre par une couleur plus sombre mais de même ton. Ruguleux à bosselé surtout au centre, pouvant se tacher de violet. Marge enroulée et flexueuse.

Lames :

Jusqu'à 3 mm, assez espacées, brièvement décurrentes. Blanchâtres mais vite violacées par le lait. Arête concolore finissant par présenter un filet violet qui tourne au brun, falciforme et flexueuse.

Stipe :

25x11 mm. Un peu évasé sous les lames et aminci en pointe émoussée vers la base. Arqué, rugueux, sillonné, dessinant presque un réseau lâche quand il se salit par le lait. Marqué de fines fossettes peu profondes. Blanc mais vite marbré de violet par le lait. Brunissant à la longue.

Chair :

D'abord ferme puis molle, blanche, à peine marquée de violet après un séjour dans le frigo. Subdouce à un peu astringente mais beaucoup moins que luridus, odeur fruité un peu pélagronnée (?).lait blanc devenant pourpre violet à l'air, doux.

Microscopie :


Spores (A) : 7-9x6,5,5 μm . Subglobuleuses à elliptiques, ornementation en grande partie reticulée et assez haute avec des verrues isolées.

Basides (B) : 40-55x11-13 μm , quadrisporiques.

Cheilocystides (C) : 40-60x5-10 μm , fusiformes appendiculées, parfois fripées au sommet, très nombreuses.

Pleurocystides (D) : 55-80x8-12 μm , de même types mais plus grandes, également très nombreuses..

Articles du suprapellis (E) : formé d'hyphes enchevêtrées de 1,5-4 μm , gélifiées dans la partie supérieure du revêtement.



Discussion :

Voir fiche de luridus