

DERNIERES CORRECTIONS apportées à « Essai d'une approche microscopique..... Basidiomycètes parasites »

p. 19, bas de page :

| | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| 6. (4) | Hyménium très souvent poré, rarement lamellé (et alors lames +/- décurrentes, facilement séparables de la chair avec l'ongle : <i>Paxillus, Hygrophoropsis, Omphalotus, Gomphidius, Chroogomphus</i>) | Ordre des Bolétales, 10. |
| | Hyménium toujours lamellé | 7. |

p. 20, 9/3 : sporée..... violacé Cortinariales, 83 **ou Familles**, clé 13, p. 78

p.23, haut de page :

| | | |
|------|--|-----|
| 48. | Allure de collybie ou de mycène ; esp. peu charnues ; basides < 30 µm, parfois parasites | 49. |
| (40) | Allure de tricholome ou de pleurote ; esp. charnues ; basides > 30 µm (sauf les <i>Calocybe</i> , qui en outre ont des basides sidérophiles) | 51. |

p. 23, 52/1 : *Calocybe*, pp. 23-55, **Clé K p. 55**

p. 27, 84/2 : anneau bien développé, **une armille, mais très souvent une cortine très fugace**

p. 28, 102/4 :

| | | |
|-------|---|---------------------------------------|
| 102. | Présence d'une cortine parfois fugace | Section <i>Hebeloma</i>, 103. |
| (92b) | Cortine douteuse ; Sp. calyptrées ; pied souvent radicant ; pas d'odeur raphanoïde ; lames non « pleureuses » | Section <i>Scabrispora</i> |
| | Pas de cortine ; odeur raphanoïde (souvent) ou aromatique ; très souvent des « pleurs » sur les lames | Section <i>Denudata</i> |
| | Pas de cortine ; odeur florale, forte et agréable | Section <i>Sacchariolentia</i> |

p. 71, 0/2 & 0/3

| | |
|--|----|
| Espèces de taille généralement moyenne à grande (Ø 5-12 cm) ; Sp. J- (sauf <i>C. maculata</i>) | 1. |
| Espèces de taille généralement moyenne à petite : Ø 1-5(8) cm ; Sp. J- (rares exceptions) | 6. |

p. 97, 3/1 : section *Sacchariolentia*, **clé suivante, 6/1**

p. 97, 3/1 : section ***Sacchariolentia***

p. 100, 2/1

| | | |
|----|---|--|
| 2. | Lames décurrentes ; couleur terne, pâle ou orangée ; lames à trame irrégulière ; hyphes bouclées ; espèces praticoles | genre <i>Cuphophyllus</i>, & Clé 26, p. 101 |
| | Lames non décurrentes (ou peu & rarement) ; couleurs vives ; lames à trame parallèle (voir définition complète ci-dessus) | genre <i>Hygrocybe</i>, 4 (sections) & Clé 26, p. 101 |

p. 108, 2/2

| | | |
|----|---|-----|
| 2. | Odeur aromatique évidente, facilement reconnaissable | 3. |
| | Odeur particulière, dite spermatique (mélange complexe, avec une base de farine mouillée) | 8. |
| | Pas d'odeur particulière | 14. |

p. 109, 2/2

| | | |
|-----|---|---|
| 8. | Ch. d'un beau bleu violacé, à mamelon parfois jaunissant ; pour le reste, semblable au type (voir 9/2 ci-dessous) | <i>I. geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (= <i>lilacina</i>) |
| (2) | Ch. dans des tons nettement blanchâtres | 9. |
| | Ch. dans des tons jaune ocre à brun clair | 10. |
| | Ch. nettement hérissé-squamuleux de foncé | 11. |

p. 127, 15/3 : chapeau dans des tonalités de brun **mêlé de gris-violet-mauve**

Si vous constatez un « bug » lors de l'utilisation de ces clés, merci de me le signaler à cette adresse : mlecomte@skynet.be