



Puccinia artemisiella sur *Artemisia vulgaris* (armoïse commune). Perk, le 04/102025
Fiche conçue et réalisée par Daniel Deschuyteneer



Urédospores épineuses, mesurant pour N = 20
(22,6)23,1-**25,4**-27,3 (28) × (20,3)21,1-**23,7**-25,7(26,4) μm.



Téleutospores lisses, biloculées, mesurant pour N = 20 : (37,5)40,5-**43,6**-47,5(52,7) × (13,8)14,4-**16,3**-18,1(18,5) µm.
A titre de comparaison je reproduit ci-dessous les mesures qui ont été effectuées sur une autre récolte, également réalisée sur *Artemisia vulgaris* et qui était infestée par *Puccinia absinthii* : (29,5)32,6-**36,7**-39,6(49,3) × (19,4)21,4-**23,4**-26,5(29,5) µm.
Par comparaison on constate que la différence principale entre les deux espèces réside essentiellement dans la mesure effectuée au niveau du septum, qui est ici plus étroit (7 µm plus court) avec des spores davantage rétrécies à ce niveau.



Téleutospores possédant un long pédicule hyalin
(37,5)40,5-**43,6**-47,5(52,7) × (13,8)14,4-**16,3**-18,1(18,5) µm.

