

Puccinia sessilis sur « baldingère = faux-roseau » (***Phalaris arundinacea*** déterminée par B. Clesse), Perk, Hellenbos, zone très humide, 15/08/2025

Dossier créé par Daniel Deschuyteneer

Phalaris arundinacea




Phalaris arundinacea, illustration botanique, Jan Kops, *Flora Batava*, volume 7 (1830).






Urédosores de couleur rouille

Urédospores mesurant N= 20 : (24,8)25,9-27,4(28,7) × (22,4)24-26,2(26,7) μm




Pores germinatifs (de 1 à 4) mis en évidence dans le bleu coton lactophéno



Téleutosores noirs, disséminés sur les feuilles et les tiges.

Téleutospores : N = 20 ; (32,8)36,3-45,4(50,2) × (12,3)14,4-18,5(19,7) μm

Apex très épais : 2,1-5,9 μm



Urédospores, mesures : N = 20

(24,8)25,9-27,4(28,7) × (22,4)24-26,2(26,7) μm

Me = 26,7 × 25,1 μm

Téleutospores, mesures : N = 20

(32,8)36,3-45,4(50,2) × (12,3)14,4-18,5(19,7) μm

Me = 41 × 16,6 μm

Epaisseur de l'apex des téleutospores : N = 20

2,1-5,9 μm

Me = 3,7 μm

Paraphyses apparemment absentes.