



Psathyrella cortinarioides P. D. Orton 1960
in Trans. Brit. Mycol. Soc. 43(2): 369f.
D. Deschuyteneer

Chapeau jusque 25 mm de diamètre.
Sur tronc moussu.




Photo in situ leg. : Patrice Tanchaud - <https://www.mycocharentes.fr/pdf1/2932.pdf>.

Spores **fort pâles**, à **paroi épaisse**, jaune-brunâtre, non opaques, contenant une ou deux larges gouttes mucoïdes, ellipsoïdes de face, asymétriques et aplaties ou légèrement phaséoliformes de profil, **pore germinatif absent ou indistinct** et alors limité à un callus central.




Spores mesurées avec Piximètre : (N = 100)
 (6,3) 7,1 - 8 (8,6) × (4,1) 4,2 - 4,8 (5,1) μm ;
Me = 7,6 × 4,5 μm ;
 Q = (1,4) 1,6 - 1,8 (1,9) ; Qe = 1,7



Cheilocystides éparses ou sous forme de cluster, utriformes, clavées, spatulées, cylindriques, parfois à paroi légèrement épaisse, noyées au sein de très nombreuses paracystides de toutes dimensions, clavées et subpyriformes, à paroi fine.





Mesures avec Piximètre : (N = 65)
(22,3) 26,6 - 34,1 (40,3) × (9,9) 10,9 - 13,4 (15,2) µm ;
Me = 29,9 × 12,1 µm.

Cheilocystides éparses et nombreuses paracystides









Pleurocystides très nombreuses, cylindro-lagéniformes, parfois utriformes, à **paroi épaissie**, parfois colorées, à sommet largement obtus, souvent pédicellées



NH40H



Mesures avec Piximètre : N = 50
(40,8) 44,8 - 60,5 (63,8) × (11) 12 - 15 (16) µm ;
Me = 52,6 × 13,4 µm.



Pleurocystides + RCSDS



Voile partiellement bouclé, resté fixé au pileipellis

