

Psathyrella marcescibilis

- Cette espèce, faisait anciennement partie du sous-genre *Psathyrella*, et était connue sous le nom de *Psathyrella marcescibilis* (Britzelm.) Singer.
- Suite à de nombreuses études phylogénétiques récentes, cette espèce est rattachée aujourd'hui au sous genre *Coprinopsis* sect. *Tomentosi* subsect. *Marcescibili* (Source : A. MELZER), tout comme *Psathyrella caniceps* et *Psathyrella pannucioides*.
- Dixit Jean-Yves Jutard qui fait notamment référence aux articles de Keirle, Hemmes & Desjardin (2004) et de Larsson & Örstadius (2008) , le sous-genre *Coprinopsis* P. Karst. est défini par :
 - des lames immatures de couleur non rosâtre,
 - un voile piléique souvent farineux, floconneux, ou en plaques,
 - l'intérieur du stipe sans mèche,
 - un état déliquescent à maturité,
 - la structure du pileipellis en cutis (hyphes allongées),
 - l'absence de piléocystides,
 - des pleurocystides généralement présentes,
 - des boucles présentes.

Veillez donc vous référer à la fiche intitulée :

***Coprinopsis marcescibilis* (Britzelm.1893) Örstadius & E. Larss. 2008**