

Lactarius tristis : mythe ou réalité ?

Marcel Lecomte, avec la collaboration de Jean-Louis Cheype²¹

Il y a nombre d'années déjà, nous avons eu l'occasion de discuter avec Jean-Louis Cheype d'une de ses trouvailles, qu'il avait appelée *Lactarius tristis*. Elle avait été présentée à une réunion de la F.M.B.D.S. à laquelle assistait Pierre Arthur Moreau, qui l'avait tout de suite reconnue, l'ayant déjà récoltée lui-même.

Suite à cela, nous avons pris contact avec P.A.M., notre référence en matière de systématique des lactaires. Voici sa réponse :

« Je connais ce champignon depuis très (très) longtemps, et je l'appelais aussi *L. tristis*, d'après Bon et Blum. Pour moi, c'est une espèce acidophile liée aux hêtres en milieu humide, typiquement sur les talus. J'ai longtemps pensé à l'appeler *blennius* ou *fluens* ; le 1er à cause des spores, mais la viscosité était trop faible ; le second à cause de la viscosité faible, mais ni la couleur ni la micro ne correspondent... Bref, rien ne marchait ! Toutefois les différences sont maigres pour le différencier de *blennius* d'après mes observations micro ; le seul caractère utilisable était l'épaisseur du gélín, mais que faire en cas de sécheresse ?... »

Je connais deux stations de *L. tristis* :

- dans le Cantal, en fond de vallon le long d'une rivière, sous *Fagus*, alt. 700 m.
- en Savoie, à La Motte-Servolex, sous *Fagus*, dans un parc municipal, alt. 380 m.

Ce n'est pas une espèce montagnarde, peut-être un peu continentale, mais j'en doute. Je pense qu'elle doit se trouver dans toute l'aire du hêtre, en cherchant bien. En tout cas elle est peut-être localisée à peu de stations par rapport à *blennius*, mais elle est sûrement largement répandue.

Je ne l'ai jamais vu à Vallandry, mais nous avons très peu de hêtres. »

Voici également les commentaires qui nous avaient été transmis par J.L. Cheype :

« J'ai le sentiment qu'il s'agit d'une espèce à réhabiliter. Blum la définit comme une espèce ayant le port d'un vietus avec les couleurs d'un *blennius* très délavé. Récolte du 10/10/2003 à Sous-le-Saix (Passy) (MEN 3530D), sur sol argileux sous *Salix caprea*, avec *Fagus* à proximité, au bord d'un chemin très humide.

Chapeau gris-verdâtre à marge plus pâle, peu visqueux, zoné, avec au centre avec un petit mamelon aigu. Lames serrées blanchâtres ; lait blanc devenant gris vert. Pileipellis avec hyphes à pigment incrustant zébrant et en plaques. Spores sub-globuleuses : 7-8 x 6-6,5 μm , bassement créées.

Je pense que cette espèce n'est pas rare et on la classe le plus souvent comme un *L. blennius* « mal foutu », malgré la cuticule beaucoup trop sèche. »



N'ayant jamais rencontré ce champignon, nous prenons contact avec notre ami Paul Pirot, remarquable mycologue de terrain, passionné du genre *Lactarius*, qui déclare n'avoir jamais vu non plus cette espèce, bien qu'ayant bourlingué partout en France et en Belgique, avec les sommités de la mycologie.

²¹ jean-louis.cheype@orange.fr

Un coup d'œil rapide dans les monographies de M.T. BASSO (1999), HEILMANN-CLAUSEN et al. (1998), ne m'apprend rien de plus sur le sujet. Pas de traces non plus dans les « bibles » de A. MARCHAND (1980), R. COURTECUISSÉ (1986, 2000) et M. BON (1988).

Il va me falloir fouiller dans la « Clé monographique du genre *Lactarius* », de M. BON (1980 - voir extrait de la clé ci-dessous), pour enfin retrouver sa trace, ainsi que dans « Les lactaires » de BLUM (1976). Suite à cela, le scepticisme s'installe et ce nom va quitter notre esprit peu à peu, oubliant même de nous intéresser *aux blennius* un peu bizarres.

b) Chapeau gris blanchâtre, livide à isabelle rosâtre avec reflets verdâtres, humide non visqueux, comme un *L. blennius* desséché ou décoloré. Lames blanchâtres à fauve roussâtre puis tachée de gris vert. Stipe allongé, jaunâtre. Chair âcre, inodore. Spores comme *L. vietus* ou un peu plus allongées, 9(10) x 6-7 µm à crêtes et épines un peu plus épaisses et réticule presque complet - Feuillus, charmes (B1.184 - Ico.: Cke.1009=1085-B, Kb.40:26-29). *L. TRISTIS* (Kb) ss. Blum (Nb. à chapeau plus sombre, subvelouté cf. *L. umbrinus* ; *Floccosi* § 3 a)

Et puis, le 19/10/2007, lors du congrès de la Société Mycologique de Strasbourg, à Lucelle (F-68480), en France, à la frontière du Jura suisse, une série de lactaires bizarres sont soumis à Paul Herzog qui, sans hésitation, annonce : *Lactarius tristis*. S'ensuit une discussion très constructive qui nous amène à la conclusion suivante : « enfin, nous avons en main cette espèce qualifiée de fantomatique ! ».

Lactarius tristis, Lucelle, 2007, photo Marcel Lecomte

Et en effet, cela ressemble vraiment beaucoup à *L. blennius* ou à *L. vietus*, surtout avec la cuticule humide.

S'ensuit un examen attentif : exemplaires de taille moyenne, de 5 à 8 cm de diamètre, chapeau avec des nuances gris vert à dominante rosâtre, et de vagues cernes incomplets, nettement creusé au centre. Cuticule un peu brillante, collante aux lèvres, d'apparence humide, mais non réellement visqueuse.



Lames blanchâtres, moyennement serrées, devenant vite rose chair, avec lamelles et lamellules.

Lait âcre, blanc à l'émergence, mais séchant en perles gris verdâtre. Chair blanche, ferme, âcre, inodore. Pied cylindrique, concolore aux lames. Récolte réalisée sous *Fagus*, en terrain lourd et pentu.

Les photos présentées dans cet article n'ont pas été réalisées in situ, à Lucelle.

Lactarius tristis, Lucelle, 2007, photo André Février

Commentaires :

Lorsqu'on a pu manipuler ce champignon, il apparaît comme une évidence qu'il s'agit d'une espèce à part entière, ni tout à fait *blennius*, ni tout à fait *vietus*.

Bibliographie

- BASSO M.T.**, 1999 - *Lactarius* Pers. Volume n°7 de Fungi Europaei, Alassio, Mykof Iora, : 723-735
BLUM J., 1976 - Etudes Mycologiques III : Les Lactaires. France, Lechevalier : 73-87 et 96-97
BON M., 1988 - Champignons d'Europe occidentale. France, Arthaud : 94-95
BON M., 1980 - Documents Mycologiques : Clé Monographique du Genre *Lactarius*. France, tome 10, fascicule 40 : 13-15
COOKE, planches 1009 - 1085B
COURTECUISSE R., 1986 - Clé de détermination macroscopique des champignons supérieurs des régions du Nord de la France. Société Mycologique du Nord : 160
COURTECUISSE R., DUHEM B., 1994 - Guide des champignons de France et d'Europe. Lausanne, Delachaux & Niestlé : 398-399
COURTECUISSE R., 2000, - Photo-Guide des Champignons d'Europe. Lausanne, Delachaux et Niestlé : 792, n°817
HEILMANN-CLAUSEN J., VERBEKEN A. & VESTERHOLT J., 1998 - The Genus *Lactarius*. Fungi of Northern Europe, Vol. 2 : 248-251
KROMBOLZ, - Atlas t. 40, fig. 26-29
KÜHNER R. & ROMAGNESI H., 1953, reprint 1984 - Flore Analytique des Champignons Supérieurs. France, Masson : 473
LANGE J.E., 1994 - Flora Agaricina Danica. Italie, volume 2 : 534, planche 171
MARCHAND A., 1980 - Champignons du Nord et du Midi. France, SMPM, tome 6 : 6-11

Nos artistes sont à l'œuvre : *Cortinarius obsoletus* — dessin électronique de Jacques Gane

